

This product was adapted from the DKQ "Diabetes Knowledge Questionnaire," - Garcia and Associates for the diabetes self management project at Gateway Community Health Center, Inc. in Laredo, TX. Support for Gateway Community Health Center was provided by a grant from the Robert Wood Johnson Foundation® in Princeton, New Jersey.

Patient's Diabetes Knowledge Questionnaire

| Preguntas Questions | | Sí Yes | No No Se Don't Know | No Se Don't Know |
|------------------------|--|-----------|---------------------------|---------------------|
| | | | | |
| 1 | El comer mucha azúcar y otras comidas dulces es una causa de la diabetes. Eating too much sugar and other sweet foods is a cause of diabetes. | | | |
| 2 | La causa comun de la diabetes es la falta de insulina efectiva en el cuerpo. The usual cause of diabetes is lack of effective insulin in the body. | | | |
| 3 | La diabetes es causada porque los riñones no pueden mantener el azúcar fuera de la orina. Diabetes is caused by failure of the kidneys to keep sugar out of the urine. | | | |
| 4 | Los riñones producen la insulina. Kidneys produce insulin. | | | |
| 5 | En la diabetes que no se está bajo tratamiento, la cantidad de azúcar en la sangre usualmente sube. In untreated diabetes, the amount of sugar in the blood usually increases. | | | |
| 6 | Si yo soy diabetico, mis hijos tendrán más riesgo de ser diabeticos. If I am diabetic, my children have a higher chance of being diabetic. | | | |
| 7 | Se puede curar la diabetes. Diabetes can be cured. | | | |
| 8 | Un nivel de azúcar de 210mg./dl. en prueba de sangre hecho en ayunas es muy alto. A fasting blood sugar level of 210 is too high. | | | |
| 9 | La mejor manera de checar mi diabetes es haciendo pruebas de orina. The best way to check my diabetes is by testing my urine. | | | |
| 10 | El ejercicio regular aumentara la necesidad de insulina o otro medicamento para la diabetes. Regular exercise will increase the need for insulin or other diabetic medication. | | | |
| 11 | Hay dos tipos principales de diabetes: Tipo 1 (dependiente de insulina) y Tipo 2: (no-dependiente de insulina). There are two main types of diabetes: Type 1 (insulin-dependent) and Type 2 (non-insulin dependent). | | | |
| 12 | Una reacción de insulina es causada por mucha comida. An insulin reaction is caused by too much food. | | | |
| 13 | La medicina es más importante que la dieta y el ejercicio para controlar mi diabetes. Medication is more important than diet and exercise to control my diabetes. | | | |
| 14 | La diabetes frecuentemente causa mala circulación. Diabetes often causes poor circulation; | | | |
| 15 | Heridas o cortadas tardan más en cicatrizar cuando la persona tiene diabetes. Cuts and abrasions on diabetes heal more slowly. | | | |
| 16 | Los diabéticos deben tener cuidado especial cuando se cortan las uñas. Diabetics should take extra care when cutting their toenails. | | | |
| 17 | Una persona con diabetes debe limpiar una cortada con yodo y alcohol. A person with diabetes should cleanse a cut with iodine and alcohol. | | | |
| 18 | La manera en que preparo mi comida es igual de importante que las comidas que como. The way I prepare my food is as important as the foods I eat. | | | |
| 19 | La diabetes puede dañar mis riñones. Diabetes can damage my kidneys. | | | |
| 20 | La diabetes puede causar que yo pierda la sensación en mis manos, dedos y pies. Diabetes can cause loss of feeling in my hands, fingers, and feet. | | | |
| 21 | El temblor y sudar son señales de azúcar alta en la sangre. Shaking and sweating are signs of high blood sugar. | | | |